

Radna oblast:
Firme u poljoprivredi,
šumarstvu i povrtlarstvu

Uputstva za rad

u skladu sa § 14 Pravilnika o zaštiti na radu s
biološkim supstancama

Datum:

Aktivnost:
Osigurana lica s
više kontakata sa
klijentima, kolegama i sl.
kao na primer
u prodavnici na farmi,
u povrtlarskoj firmi
ili rasadniku drveća

BIOLOŠKE RADNE SUPSTANCE

Virus korone SARS-CoV-2 – Rizična grupa 3

OPASNOSTI ZA LJUDE



Bolest prouzrokovana virusom korone 2019. (COVID-19) prenosi se sa osobe na osobu infekcijom virusom korone SARS-CoV-2.

Prenosni put:

Virus se prenosi na sluznice (usta, nos, oči) kapljicama u vazduhu (infekcija kapljicama) ili kontaminiranim rukama (infekcija razmazom).

Vreme inkubacije:

Period nakon infekcije do pojave simptoma može da potrajati od nekoliko dana do dve nedelje.

Uticaji na zdravlje:

Infekcije su obično blage i bez simptoma. Mogu se pojaviti i akutni simptomi bolesti, npr. respiratorne bolesti s visokom temperaturom, kašljem, otežano disanje i poteškoće s disanjem. U težim slučajevima infekcija može da prouzrokuje upalu pluća, teški akutni respiratorni sindrom (SARS), zatajenje bubrega, pa čak i smrt. To se posebno odnosi na hronično bolesne osobe ili one čiji je imuni sistem oslabljen.

ZAŠTITNE MERE I PRAVILA PONAŠANJA



Za zaštitu od zaraze virusom korone potrebno je poštovati sledeće mere ponašanja:

- Kontakt sa što manje osoba
- Uvek držati rastojanje od najmanje 1,5 m, po mogućnosti
- Pridržavati se higijenskih mera
- Lična zaštita putem maske za usta i nos

Za smanjenje rizika od infekcije, potrebno je poštovati osnovne higijenske mere, koje se preporučuju i za prevenciju gripe:

- Izbegavati rukovanje i telesne kontakte
- Redovno, često i temeljno prati ruke (najmanje 20 sekundi sapunom do zgloba)
- Koristiti sredstva za dezinfekciju ruku, kada pranje ruku nije moguće. Adekvatna testirana i priznata sredstva za dezinfekciju nalaze se npr. na spisku Instituta Robert Koch (www.rki.de).
- Držati ruke dalje od lica
- Kašljati i kijati u maramicu ili u lakat ruke
- Održavati minimalno rastojanje od 1,5 m od drugih osoba
- Ako nije moguće održavati rastojanje od 1,5 m, potrebno je da se nose odgovarajuće maske (FFP2 ili ekvivalentne)
- Redovno provetravati zatvorene prostorije

Za osobe s hroničnim bolestima disajnih puteva i osobe s oslabljenim imunim sistemom, posebno je važno da se dosledno provode ove zaštitne mere.

PONAŠANJE U SLUČAJU OPASNOSTI - PRVA POMOĆ



U slučaju pojave simptoma bolesti, odmah izvestiti svog pretpostavljenog, nazvati lekara telefonom i dogovoriti se o daljim merama

PRAVILNO BACANJE SMEĆA

Kućno smeće se baca kao i uobičajeno na obradu