

Радна област:

Фирме у пољопривреди,
шумарству и
повртларству

Упутства за рад

у складу са § 14 Правилника о заштити на раду с
биолошким супстанцама

Активност:

Осигурана лица с
више контаката са
клијентима, колегама и сл.
као на пример
у продавници на фарми,
у повртларској фирми
или расаднику дрвећа

Датум:

БИОЛОШКЕ РАДНЕ СУПСТАНЦЕ

Вирус короне SARS-CoV-2 – Ризична група 3

ОПАСНОСТИ ЗА ЉУДЕ



Болест проузрокована вирусом короне 2019. (COVID-19) преноси се са особе на особу инфекцијом вирусом короне SARS-CoV-2.

Преносни пут:

Вирус се преноси на слузнице (уста, нос, очи) капљицама у ваздуху (инфекција капљицама) или контаминираним рукама (инфекција размазом).

Време инкубације:

Период након инфекције до појаве симптома може да потрајати од неколико дана до две недеље.

Утицаји на здравље:

Инфекције су обично благе и без симптома. Могу се појавити и акутни симптоми болести, нпр. респираторне болести с високом температуром, кашљем, отежано дисање и потешкоће с дисањем. У тежим случајевима инфекција може да проузрокје упалу плућа, тешки акутни респираторни синдром (SARS), затајење бубрега, па чак и смрт. То се посебно односи на хронично болесне особе или оне чији је имуни систем ослабљен.

ЗАШТИТНЕ МЕРЕ И ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

**За заштиту од заразе вирусом короне потребно је поштовати следеће мере понашања:**

- Контакт са што мање особа
- Увек држати растојање од најмање 1,5 м, по могућности
- Придржавати се хигијенских мера
- Лична заштита путем маске за уста и нос

За смањење ризика од инфекције, потребно је поштовати основне хигијенске мере, које се препоручују и за превенцију грипе:

- Избегавати руковање и телесне контакте
- Редовно, често и темељно прати руке (најмање 20 секунди сапуном до зглоба)
- Користити средства за дезинфекцију руку, када прање руку није могуће. Адекватна тестирана и призната средства за дезинфекцију налазе се нпр. на списку Института Роберт Коцх (www.rki.de).
- Држати руке даље од лица
- Кашљати и кијати у марамицу или у лакат руке
- Одржавати минимално растојање од 1,5 м од других особа
- Ако није могуће одржавати растојање од 1,5 м, потребно је да се носе одговарајуће маске (ФФП2 или еквивалентне)
- Редовно проветравати затворене просторије

За особе с хроничним болестима дисајних путева и особе с ослабљеним имуни системом, посебно је важно да се доследно проводе ове заштитне мере.

ПОНАШАЊЕ У СЛУЧАЈУ ОПАСНОСТИ - ПРВА ПОМОЋ



У случају појаве симптома болести, одмах известити свог претпостављеног, назвати лекара телефоном и договорити се о даљим мерама

ПРАВИЛНО БАЦАЊЕ СМЕЋА

Кућно смеће се баца као и уобичајено на обраду